

へん せき 扁鵲

生薬製剤

医薬品

11種類の生薬が脂肪過多症に効く

体脂肪が過剰に蓄積された状態を肥満症（脂肪過多症）といいます。

体脂肪、蓄積されていませんか？

脂肪過多症に扁鵲



芍薬



桂皮



甘草



半夏



升麻



大黄



沢瀉



牡丹皮




柴胡



生姜



猪苓



※添加物は含有していません。

扁鵲 へんせき

効能・効果

脂肪過多症

用法・用量

食間に水又はお湯にて服用します。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(16歳以上)	1包	3回
7～15歳	1/2包	
7歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 食間とは、食事と食事の中間という意味で、食後2時間後位をいいます。
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

本品3包(6.0g)中、下記生薬を含有します。

タクシャ末…0.86g	ダイオウ末…0.43g	ショウキョウ末…0.43g
カンゾウ末…0.43g	ケイヒ末…0.43g	シャクヤク末…0.43g
ボタンピ末…0.43g	チョレイ末…0.86g	サイコ末…0.86g
ハンゲ末…0.43g	ショウマ末…0.43g	

添加物は含有していません。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、天然の生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることありますが、品質に変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
(4) 1包を分割したり残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人
(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
(5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
(6) 次の医薬品を服用している人 瀉下薬(下剤)


2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、添付文書をもって医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
軟便、下痢



11種類の生薬が
脂肪過多症に効く



へん せき
扁鵲

生薬製剤 医薬品

価格

製品名	包装／(梱包単位)	希望小売価格
医薬品 扁鵲(へんせき) 60包入	個装：1箱＝2g ×60包 (外装：2g ×60包×4×6)	4,800円 (115,200円)

※商品の発注は、梱単位(2g ×60包×4×6)でお願い致します。 ※希望価格に消費税は含まれません。

サイズ、重量、統一商品コード、JANコード、ITFコード

包装	サイズ(縦×横×高さ) 重量	統一コード	JANコード	ITFコード
2g×60包	70mm×84mm×154mm 197g	117670417	4 987117 670417	—
2g×60包 ×4	172mm×141mm×158mm 840g	—	4 987117 670424	—
2g×60包 ×4×6	360mm×435mm×180mm 5,700g	—	4 987117 670431	0134987117670431