

■ 使用上の注意

(1)次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- 医師の治療を受けている人。

(2)次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- しばらく服用しても症状がよくなる場合。

■ 効能・効果

食べ過ぎ又は飲み過ぎによる胃部不快感及びはきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)

■ 用法・用量

成人(15歳以上) 1日1回1本(50mL)を食前に服用してください。

- 小児(15歳未満)は服用しないでください。
- 用法・用量を守ってください。

■ 成分 1本(50mL)中

ウコンエキス200mg(鬱金2000mgに相当)

コウジンエキス83.3mg(紅参333.2mgに相当)

ソヨウエキス37mg(蘇葉333mgに相当)

チョウジ油(丁子油)5mg

グリチルリチン酸二カリウム7.2mg

添加物:グリセリン、果糖、プロピレングリコール、ブドウ糖、
ポビドン、クエン酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、
L-メントール、安息香酸Na、pH調整剤、バニリン、香料

- 生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用してください。



■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

サイズ、重量、JAN、ITFコード

	1本(50mL)	8本(箱)	50mL×8本×6箱
サイズ(縦×横×高さ[単位:mm])	径44×105(高さ)	89×177×107	280×365×115
重量(g)	135	1,145	7,100
メーカー 希望小売価格(税別)	350円	2,800円	16,800円
JAN	 4514 4653	 4 987117 396065	 4 987117 396072
ITF	—	—	 149 87117 39605 5



大鵬薬品工業株式会社